

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU

BİRİMİ ve BÖLÜMÜ	PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI	TARİHİ	NO
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri	ARS.GÖR.DR. Cemile Merve SEYMEN TEL : 0312 202 6918 - 0533 623 6466	03/01/2018	1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE
(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

'01/2017-28' kodlu ve 'POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA ENDOMETRİUM ÜZERİNE MELATONİN'İN OLASI KORUYUCU ETKİSİ' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 19 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza:



Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliği
1	IGF-1 Primer Antikor	1	ADET	<ul style="list-style-type: none">•Tavsandan elde edilmiş, poliklonal ve IgG izotipinde olmalıdır.•Rat, insan, fare spesifik olmalıdır.•Ürünün konsantrasyonu 1µg/µL olmalıdır.•Ambalaj şekli 100µL ve ürün 1 adet olmalıdır.•Orijinal ambalajında olmalıdır.•Araştırma amaçlı olmalıdır.•Çin mali olmamalı, Avrupa menşei olmalıdır.•-20°C'de 12 ay boyunca saklanabilir olmalıdır.•Ürün datasheeti ile birlikte gönderilmelidir.•Ürünün saklama tamponu %1 BSA, %50 gliserol ve %0.09 sodyum azid içermelidir.•Protein A ile saflaştırılmış olmalıdır.•Formalinle fikse edilmiş, parafine gömülmüş dokularda immünohistokimya (IHC-P) uygulamaları için 1:50-200 oranlarında dilüsyonu hazırlanabilir olmalıdır.•İmmünofloresan (IF) uygulamaları için 1:50-200 oranlarında dilüsyonları hazırlanabilir olmalıdır.•Western Blot (WB) uygulamaları için 1:100-1000 oranlarında dilüsyonları hazırlanabilir olmalıdır.• Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir.•Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.
2	IGF-1R Primer Antikor	1	ADET	<ul style="list-style-type: none">•Tavsandan elde edilmiş, poliklonal ve IgG izotipinde olmalıdır.•Fare, insan ve fare spesifik olmalıdır.•Araştırma amaçlı olmalıdır.•Ürünün konsantrasyonu 1mg/mL'de 100µg olmalıdır.•Ambalaj şekli 100µg ve ürün 1 adet olmalıdır.•-20°C'de saklanabilir olmalıdır.•Orijinal ambalajında olmalıdır.•Çin mali olmamalı, Avrupa menşei olmalıdır.•Ürün datasheeti ile birlikte gönderilmelidir.•Ürünün saklama tamponu %0.02 sodyum azid, %50 gliserol, PBS (Mg+2 ve Ca+2 içermemelidir), 150 mM sodyum klorür içermeli ve pH= 7.4 olmalıdır.•Formalinle fikse edilmiş, parafine gömülmüş dokularda immünohistokimya (IHC-P), Western Blot (WB), frozen kesitlerde immünohistokimya (IHC-Fr) uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.•Formalinle fikse edilmiş, parafine gömülmüş dokularda immünohistokimya (IHC-P) uygulamaları için 1:50-1:100 oranlarında dilüsyonları hazırlanabilir olmalıdır.•Western Blot uygulamaları için 1/500-1/1000

03.2.6.01saf
Kısm